

# Birthright

SUSTITUTO LÁCTEO AL **100%**



## TIPS PARA LA ALIMENTACIÓN MANUAL CON BIRTHRIGHT



### **BIRTHRIGHT ES EL ÚNICO SUSTITUTO LÁCTEO PARA LECHONES CUYO DISEÑO IGUALA LA CALIDAD DE LA LECHE MATERNA.**

La suplementación del lechón con Birthright puede:

1. Reducir la mortalidad predestete.
2. Mejorar el peso al destete.
3. Ayudar a la cerda a mantener su condición corporal.
4. Ayudar a suplementar cerdas que presentan fallas lactacionales.
5. Alcanzar mayor uniformidad de la camada.
6. Rescatar lechones huérfanos.



## PRIMERAS RECOMENDACIONES

Debe asegurarse que todos los lechones reciban calostro adecuadamente después del nacimiento.

- **Dé atención individual** a los lechones pequeños que estén por debajo de 1.1 kg en cuanto nazcan. Seque a todos los lechones y póngalos bajo la lámpara.
- **Se recomienda** una dosis de **First Pulse D** (2cc) después de nacer.
- **Asegúrese** que todos los lechones hayan tomado calostro, ayude y marque a cada lechón que haya sido calostrado. Se recomienda proporcionarles una segunda toma de calostro en el primer día (15 a 20 ml por lechón).
- **Reacomode** a los lechones pequeños (12 horas después del nacimiento) con una cerda de segundo o tercer parto con buen nivel de producción láctea. Las primerizas no deben ser usadas como nodrizas.

## INDICACIONES DE USO

**Camadas suplementadas:** Agregue 130 g de **Birthright** por 870 ml de agua para preparar 1 L de solución. **Birthright** deberá ser suplementado 24 horas después del nacimiento hasta los 17-18 días de vida del lechón.

**Camadas grandes:** Incremente la cantidad a 150 g por 850 ml de agua para preparar 1 L de solución.

\*Si se presenta diarrea mezcle 180 g de **Birthright** por 820 ml de agua por 1 L de solución.

**Camadas con pérdida de condición en los lechones y/o cerdas con poca producción de leche:** Preparar a una concentración de 180 g por 820 ml de agua para 1 L de solución.

**Camadas huérfanas:** agregue 200 g de **Birthright** por 800 ml de agua para preparar 1 L de solución. Seguir el protocolo para manejo de lechones huérfanos.

- Añada 0.5 ml de **Regano líquido** por 1 L de solución.

## TIPS DE ALIMENTACIÓN CON BIRTHRIGHT

*La mayor mortalidad ocurre en los tres primeros días después del nacimiento, para reducir esto la suplementación deberá iniciar a las 24 horas.*

- 1. Los lechones** deberán establecerse en la ubre antes de iniciar la suplementación, esto se lleva 24 horas. En camadas donde se realice la homogenización, comenzar a las 36 horas después del nacimiento. No debe esperar demasiado ya que los lechones más grandes se acostumbrarán a la alimentación de la cerda y será más difícil que acepten el sustituto de leche.
- 2. La leche deberá suministrarse** a temperatura ambiente para evitar el sobreconsumo.
- 3. Birthright contiene Regano**, que es un saborizante y estabilizador de la leche.
- 4. En climas calientes** (verano, climas tropicales) o cuando hay una pobre calidad del agua, la leche tiende a desestabilizarse rápidamente.
  - Añada una dosis extra de **Regano líquido** de 0.25 a 0.50 ml por 1 L de leche.

- Añada una solución clorada en un rango de 8 ml por 1 L de leche. **NUNCA** las dos al mismo tiempo.
- Suministre leche fresca por lo menos dos veces al día.

**5. Los primeros días** es suficiente con llenar el fondo del alimentador.

**6. No utilice** charolas abiertas o platos para preiniciadores.

**7. Para estimular** el consumo sumerja la nariz del lechón en la leche. Una vez que uno o dos lechones comienzan a beber, los demás aprenderán por imitación.

**8. Para estimular** el consumo mantenga leche fresca y disponible la mayor cantidad de horas en el día.

**9. Es necesario** revisar a los lechones 24 horas después que se inicie la suplementación, si no están llenos es necesario alimentar a cada uno con 10 cc de **Birthright** (utilizar jeringa, perilla o tubo gastroesofágico).

**10. Nunca deje** que el alimentador se quede vacío, cuando esto ocurre al volverlo a llenar los lechones consumirán de más y esto puede ocasionar diarreas.

**11. Nunca diluya** la leche. Si esto ocurre, los cerdos consumen grandes cantidades de líquido, provocando diarreas y afectando los resultados esperados.

**12. En camadas** con buena madre puede retardarse el consumo de **Birthright**, ya que la cerda produce suficiente leche; esto no quiere decir que **Birthright** no sea palatable.

**13. Mantenga** el dispensador de leche limpio. Lávelo por lo menos una vez al día.

**14. Coloque** el dispensador en un área bien drenada, por delante de los hombros de la madre y lejos de la lámpara térmica.

**15. Utilice agua potable** para preparar la leche, de lo contrario tendrá un mezclado pobre. Las aguas duras o sucias enferman y parasitan a los lechones.

**16. No agregue productos** que contengan ácidos orgánicos en el agua que va a utilizar para reconstituir el sustituto de leche.

**17. Almacene la leche Birthright** en un lugar fresco y seco. Recomendamos guardar la leche en polvo en envases plásticos para que no adquiera olores de la maternidad.

**18. Comience la alimentación con Pellet SEW** entre el día 5-7 después del nacimiento. Se recomienda detener la suplementación láctea el día 17-18. Para estimular el consumo de **Pellet SEW** puede espolvorear **Birthright**.

**19. Si los lechones** comienzan a consumir grandes cantidades de leche **Birthright**, la cerda puede presentar mastitis, estimule el consumo de la leche de la cerda.

**Los tips son únicamente para el uso de Birthright, no fueron diseñados para ningún otro sustituto de leche.**



Para mayor información consulte al Servicio Técnico.